

Соғлом бошок -
соғлом ҳосил!



Колосаль®

Фунгицид

тебуконазол, 250 г/л

- аъло даражада тизимли хусусият ва тез таъсир
- кенг таъсир қўлами – буғдойнинг энг заарли касалликларининг самарали назорати
- касалликларнинг олди олиниши ва даволаниши
- узоқ муддатли ҳимоя



С нами рости легче

avgust 
crop protection

Соғлом бошок - соғлом ҳосил!

Буғдой ва ток касалларига қарши курашда ишлатиш учун олдини оловчи ва даъволовчи, тизимли таъсирли фунгицид.

Фунгицид таркибида 250 г/л тебуконазол бўлган эмульсия концентрати шаклида ишлаб чиқарилади. Ушбу таъсир этувчи модда триазоллар синфига мансуб ва тизимлилик хусусиятларига эга. Ксилема орқали тарқалиб, патоген хужайралари мембраналарида эргостерин биосинтезини тўхтатиб, метаболизм жараёнларини бузади.

Ўсимликларга ишловдан кейинги 2 - 4 соат орасида ассимиляция қилувчи қисмлари орқали сўрилади. Тебуконазолнинг юқори даражадаги фаоллиги туфайли ишловдан кейин бир неча соат ичидәёқ ўсимликларнинг фитосанитар ҳолати яхшиланади.

Ишловдан кейин 4 - 5 ҳафта давомида экинларни инфекциядан ҳимоя қилади. Ёмғир ёғишига чидамлилиги туфайли, ишловдан кейин ёмғир ёққанида ҳам Колосаль® экинларни ишончли ҳимоя қилиши кафолатланади.

Препарат буғдойга ўсув даврининг 37 (байроқ барг қинидан энди чиқаётганида) ва (ёки) 51 (бошоқланиш бошланган даврда) босқичларида пуркалади. Токда оидиумга қарши ўсув даврининг қуйидаги босқичларида пуркалади: тўпгуллар

ҳосил бўлиши кўзга кўринганида, гуллаш охирида, мевалар мөшдай бўлган пайтда, қаттиқ, яшил мевалар ҳосил бўлишини бошланганида.

Кутиш даври буғдойда – 30 кун, токда – 50 кун.

Колосаль® фунгицидини кучли ишқорли ва кучли нордон реакцияси бўлган препараллардан бошқа пестицидларнинг аксарияти билан бак аралашмаси шаклида қўллаш мумкин. Аммо ҳар гал аралаштирилаётган препаралларнинг бир-бирига мослигини текшириб кўриш тавсия этилади.

Ишчи эритма тайёрлаш пайтида ҳар доим Колосаль® препаратини сувга солиш лозим, аксинча эмас! Препаратни бакнинг аралаштиргичида аралаштириш мумкин эмас, балки препаратни ярмигача сув тўлдирилган бакка суютирилмаган ҳолда солиш лозим.

Ишчи эритма сарфи: ғалла экинларида – 300 л/га, токда – 1000 л/га ча.

Препарат идиши: ҳажми 5 ва 10 л бўлган канистралар.

Кўллаш усули

Экин	Касаллик	Препарат сарф-меъёри, л/га
Кузги буғдой	Сарик ва қўнғир занг, доғланишлар, ун-шудринг	0,3 - 0,5
Ток	Оидиум	0,15

® – «Август» АЖ фирмасининг рўйхатдан ўтган товарлик белгиси

«Avgust Aziya» QK MCHJ
Tel: (+998) 97-918-00-88

Avgust Kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy
Distribyutori «SAM AGRO CENTER» MCHJ
Tel: (+998) 99-541-44-44

avgust 
crop protection